



أروليز

(كبسولة سترات البوتاسيوم- بساط الملوك- شوكة الجمل)

وصف المنتج :

مكمل طبيعي مكون من سترات البوتاسيوم و نباتات طبيعية تستعمل تقليدا لعلاج حمى الكلى ونقص سترات البوتاسيوم في البول وكذلك بدون مضاعفات حمض اليوريك.

صفة المنتج :

مكمل غذاء على شكل اقراص للبلع

ملاحظة : يرجى مراجعة الطبيب او الصيدلي قبل الاستعمال

معلومات حول المنتج :

أروليز (ف.ت.ج): مستحضر للبلع عن طريق الفم مكون من سترات البوتاسيوم و مستخلص نبات بساط الملوك ومستخلص شوكة الجمل المغربية لضمان فعالية علاجية معززة. من خلال توافر البوتاسيوم النافع في الجسم و تعديل معدل الحموضة (PH) - في البول
- يعمل على تخفيض اوكسالات الكالسيوم كذلك تخفيض حمض اليوريك الضار عن طريق تعديل الحموضة .

الاستعمال :

-يرجى التقيد بنصائح الطبيب المعالج او الصيدلي.
-استعمال هجومي : 02 كبسولة عن طريق الفم.
-استعمال وقائي : 01 كبسولة عن طريق الفم.
-ينصح بأخذ المكمل مع كمية معتبرة من الماء.

موانع الاستعمال:

أروليز (ف.ت.ج) لا ينصح به في الحالات التالية:

- 1 . ضعف كلوي حاد لتجنب تكلس الانسجة الداخلية للكلى وتجنب ارتفاع البوتاسيوم فالبول.
- 2 . الأشخاص الذين يعانون ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم قد يؤدي الى مضاعفات في وظيفة القلب.



العنوان: المجموعة الملكية 185 رقم 46 رأس الواد. برج بو عريبرج
ADRESSE: LOT 185 N°46 RASS ELOUAD. BBA



URILYSE « FTH »

(Gélules de citrate de potassium, Sabline rouge et la Saxifrage)

DESCRIPTION :

Cette phytothérapie est habituellement utilisée comme supplément en citrate de potassium associé à un puissant anti-lithiasique. Elle est indiquée comme supplément pour le traitement de la lithiase rénale calcique avec hypocitraturie de toutes étiologies, et de la lithiase d'acide urique avec ou sans calculs rénaux.

DÉNOMINATION DU COMPLÉMENT :

Complément alimentaire en gélule oblong, Il contient du : Saxifrage (Fettat el Hadjer), le Citrate de Potassium, Sabline rouge.

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce produit car il contient des informations importantes pour vous.

MODE D'ACTION :

URILYSE «FTH» est une préparation pour usage oral de citrate de potassium associée à deux extraits de plantes médicinales à action anti-lithiasique, pour assurer un meilleur résultat thérapeutique (effet synergique). L'augmentation du citrate et du pH urinaire est la principale réponse physiologique. Ainsi, il réduit la saturation urinaire des oxalates calciques due à une augmentation de la complexation de citrate du calcium, et surtout il augmente la solubilité de l'acide urique à cause de l'augmentation du pH urinaire.

DOSAGE ET ADMINISTRATION :

Veillez à toujours prendre ce complément en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

La dose recommandée est :
·Traitement d'attaque : 02 gélules par voie orale
·Traitement d'entretien : 01 gélule par voie orale

CONTRE-INDICATIONS :

URILYSE « FTH » est contre-indiqué dans les cas suivants:

1. L'insuffisance rénale : en raison des dangers de calcification des tissus mous et de l'augmentation du risque du développement de l'hyperkaliémie.
2. Les patients qui souffrent d'une infection des voies urinaires active. La capacité d'URILYSE à augmenter le citrate urinaire peut être atténuée par la dégradation enzymatique du citrate par les microorganismes. De plus, l'augmentation du pH urinaire qui résulte de la thérapie par URILYSE peut faciliter la croissance et la multiplication bactérienne.
3. Chez les patients qui souffrent d'hyperkaliémie (ou qui sont atteints d'une affection qui les prédispose à l'hyperkaliémie).

Les affections qui prédisposent à l'hyperkaliémie sont: l'insuffisance rénale chronique, le diabète sucré incontrôlé, la déshydratation aiguë, l'exercice physique épuisant chez les individus en mauvaise forme physique, l'adynamie épisodique héréditaire, la détérioration importante des tissus (comme en cas de brûlures graves), ou l'administration d'un agent modéré de potassium (comme le trimatere, le spironolactone ou l'amiloride).

4. Les patients chez qui il y a cause d'arrêt ou de délai du passage du comprimé dans le tractus gastro-intestinal, comme ceux souffrant de vidange gastrique retardé, de dysphagie, de compression œsophagienne, d'élargissement de l'oreillette gauche, d'obstruction ou de rétrécissement intestinal, ou ceux qui prennent des médicaments anticholinergiques.

5. Les patients qui souffrent d'ulcères gastroduodénaux en raison de son potentiel ulcérogénique.

6. Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique.

Interactions avec les diurétiques d'épargne de potassium :
Il faut éviter l'administration concomitante d'URILYSE et d'un diurétique d'épargne de potassium (comme le trimatere, le spironolactone ou l'amiloride) étant donné que l'administration simultanée de ces agents peut résulter en une hyperkaliémie grave. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions :

Aucune étude d'interaction n'a été réalisée. Médicaments susceptibles de faire augmenter le potassium sérique ou d'induire une hyperkaliémie. Dans l'éventualité où ces médicaments (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, suppléments potassiques, substituts de sels contenant du potassium, ciclosporine, ou autres médicaments tels que l'héparine sodique) devraient être prescrits concomitamment à l'URILYSE, une surveillance du potassium sérique est recommandée. Sur la base de l'expérience liée à l'utilisation d'autres médicaments qui inhibent le système rénine-angiotensine, l'usage concomitant des médicaments ci-dessus peut provoquer des augmentations du potassium sérique, et n'est donc pas recommandé. Médicaments affectés par les déséquilibres du potassium sérique

Fertilité, grossesse et allaitement
Grossesse
Aucune donnée clinique n'est disponible sur les grossesses exposées. Des études menées sur des animaux n'ont révélé aucun effet négatif direct ou indirect sur la gestation, le développement embryonnaire/foetal, la mise à bas, ou le développement postnatal.

URILYSE « FTH » doit être utilisé pendant la grossesse uniquement si les bénéfices attendus dépassent les risques potentiels.
Allaitement

Le potassium est excrété en petites quantités dans le lait maternel. Une décision doit être prise soit d'interrompre l'allaitement soit d'interrompre/de s'abstenir du traitement avec l'URILYSE en prenant en compte le bénéfice de l'allaitement pour l'enfant au regard du bénéfice du traitement pour la femme.

Fertilité
Le citrate de potassium n'est pas connu comme affectant la fertilité.

EMPLOI CHEZ L'ENFANT :

L'innocuité et l'efficacité chez les enfants n'ont pas encore été établies.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Certains patients peuvent développer des problèmes gastro-intestinaux mineurs durant leur traitement avec URILYSE, comme un malaise abdominal, des flatulences, des vomissements, de la diarrhée, des selles molles ou la nausée. Ces symptômes sont dus à une irritation du tractus gastro-intestinal, mais peuvent se résorber si on prend la dose avec les repas ou des collations, ou en réduisant le dosage. Déclaration des effets secondaires.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

COMMENT CONSERVER L'URILYSE ?

Tenir ce complément alimentaire hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. Ne jetez aucun complément alimentaire au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères.

Contenu de l'emballage et autres informations. Ce qui contient la FTH, en gélule.

· Les substances actives sont :

Composition (02 Gélules)	mg	التركيبية 02 كبسولة
Ingédients actifs	/	المكونات الفعالة
Spergularia rubra	240	بساط الملوك
Saxifraga granulata	240	عشبة الجمل
citrate de potassium	930	سترات البوتاسيوم
تستهلكك اروليز في إطار نمط غذائي صحي غني ومتوازن		

· Les autres composants sont : stéarate de magnésium, Cellulose Microcrystalline.

Qu'est-ce que la FTH en gélule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce complément alimentaire se présente sous forme de gélule.

Boîte de 30 gélules.

Fabricant:
Laboratoire viegerme.
Distributeur exclusif:
Octos pharm.



العنوان: المجموعة الملكية 185 رقم 46 رأس الواد. برج بو عريبرج
ADRESSE: LOT 185 N°46 RASS ELOUAD. BBA